

Allgemeine Informationen

Warum?

Als Desinfektionsmittel wirken Säuren nachhaltig gegen Bakterien, Viren und Pilze, **hauptsächlich jedoch gegen Trichomonaden.**

Als Tränkezusatz fördern die gepufferten Säuren die Darmgesundheit und Widerstandskraft ihrer Tiere. Die Dosierung zur Ansäuerung von Tränken ist abhängig von der Wasserhärte und dem pH-Wert des Wassers. Angestrebt wird ein pH-Wert des angesäuerten Wassers von 4,0.

Wir empfehlen vor dem Start einer Tränkwasseransäuerung den pH-Wert bestimmen zu lassen. Für die pH-Wert Kontrolle müssen Sie lediglich eine Wasserprobe entnehmen und in das dafür vorgesehene Röhrchen (50 ml), möglichst luftblasenfrei, einfüllen und gut verschlossen versenden. In unserem Labor wird die Analyse durchgeführt und die optimale Dosierung von der Säure SoftAcid® IV+ E, PH Control, Avidress, Acidomid oder Obstessig individuell für Ihre Tauben oder Geflügel bestimmt.



SoftAcid®

dient zur Stall- und Tränkedesinfektion sowie als Tränkezusatz für Brief-, Rassetauben und Rassegeflügel

Laborauftrag / Begleitschein für Wasserproben

(Bitte in Blockschrift ausfüllen!)

Name Vorname

Straße / Nr. PLZ / Ort

Telefon Fax

Mobil E-Mail

Taubenanzahl insgesamt Wasserverbrauch der Tauben pro Tag

Säuern Sie Ihr Trinkwasser schon an? ja nein

Wenn ja, mit welchem Präparat? (Obstessig, ph-Controll, Avodress)

.....

Wenn ja, wie oft?

weitere Informationen